

ಮಹಾತಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೆಕ್ಯೆಜೋಲ

ಸುಧಾರಿತ ಬೇನಾಯ ಕ್ರಮಗಳು

| | |
|----------------------|--|
| ಬೀಜದ ಆವೃತ್ತತೆ | 7.5 ರಿಂದ 8 ಕೆಜಿ ಎಕರೆಗೆ |
| ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಂತರ | 60 ಸೆ.ಮೀ. |
| ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಅಂತರ | 30 ಸೆ.ಮೀ. |
| ರಸಗೂಬ್ಬರ ಪ್ರಯೋಗ | ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮೊದಲು 2 ರಿಂದ 3 ಮೆ. ಟನ್ ಎಫ್‌ವೈಎಮ್ ಮತ್ತು 10 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ |
| (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ) | ಬಿತ್ತುವ ಸಮಯ : ಎನ್.ಪಿ.ಕೆ. = 20:24:20 ಬಿತ್ತಿದ 30 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ : 15 ಗ್ರಾ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೂ ಬಿಡುವಾಗ : 15 ಗ್ರಾ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ |

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ@ 500 ರಿಂದ 800 ಗ್ರಾ. ಎಟ್ರೋಜನ್ ಕರಗಿಸಿ ಕಳೆಗಳು ಬರುವ ಮೊದಲು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಸುಳಿಕೊರಕ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ 30% ಇಸಿಯ @ 2.5 ಮಿ.ಲೀ. ಅನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾದ 15 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಬಿತ್ತನೆಯಾದ 25-30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ಕೆ.ಜಿ ಪ್ಯುರಾಡಾನ್ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ.

ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ : ನೀರುಣಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಹಂತಗಳು
ಬಿತ್ತುವ ಸಮಯ
ಮೊಣಕಾಲಿನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ
ಸಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಂತ

ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತೇವ ಸಿಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಕುಗ್ಗುಹುದು.

ಸೂಚನೆ: ಕಳೆ, ರೋಗ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು.

ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾದ ವಿವರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆಯಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಿವರ ಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು, ಸ್ಥಳೀಯ, ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು/ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಅವರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೆಕ್ಯೆಜೋಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಳಸಿದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೀಜವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.



Produced & Marketed by

Mahati Seed Sciences Pvt. Ltd.

1401, 14th Floor, Babukhan Estate, Basheerbagh, Hyderabad - 500 001. Telangana.

Consumer Helpline: 040-23304924, E-mail : marketing@mahati.co.in